



# Cens col·lectiu de falciot pà·lid a Barcelona

## Atles dels ocells nidificants de Barcelona

El falciot pà·lid *Apus pallidus* cria de manera natural en penya-segats de tot tipus d'alçades, però, com altres espècies d'apòdids, s'ha adaptat molt bé a nidificar a edificacions i altres estructures fetes per l'home.

La presència del falciot negre *Apus apus* durant els mesos de primavera-estiu, espècie amb una gran similitud i molt més abundant, dificulta la identificació dels falciots pà·lids. Tot i això a partir de mitjans de setembre és molt més fàcil identificar aquests ocells aprofitant que la seva tendència a realitzar una segona posta entre els mesos de juliol i octubre, els fa marxar de les nostres latituds més tard que els falciots negres i, per tant, durant aquests mesos els falciots pà·lids són majoria en els nostres cels.

A causa de la seva dificultat d'identificació, els censos realitzats les darreres primaveres en el marc de l'*Atles dels ocells nidificants de Barcelona* no reflecteixen de manera adequada la distribució dels falciots pà·lids a la ciutat de Barcelona. Per això és necessari un esforç addicional en la detecció d'aquesta espècie i **us animem a participar en un cens col·lectiu de falciot pà·lid a la ciutat de Barcelona.**



### Metodologia

El **mecanisme de participació** serà molt senzill:

Entre el **12 i el 30 de setembre**, s'haurà de realitzar un cens durant **una hora a un quadrat UTM 1x1 de la ciutat de Barcelona** assignat prèviament. Aquest cens s'haurà de realitzar **a darrera hora de la tarda (entre les 18:00 i les 19:30 preferentment)** que és l'horari de màxima activitat de l'espècie al voltant dels nius.

Durant el cens cal buscar **només falciots pà·lids** i anotar la seva localització exacta al mapa del quadrat UTM 1x1 així com les evidències de cria observades seguint aquests tres codis:

- Per indicar forats on s'observi entrar als falciots pà·lids (**nius**). Dins de la rodona s'ha d'indicar el número d'individus que s'observa entrar i sortir dels forats.
- △ Per indicar falciots pà·lids que s'empaiten els uns als altres cridant o que volen en cercles en una determinada zona. Dins del triangle s'ha d'indicar el número d'individus observats.
- ↑ Per indicar falciots pà·lids desplaçant-se o alimentant-se, però sense empaitar-se ni volar en cercles. Al costat de la fletxa s'ha d'indicar el número d'individus observats.

Pots veure un exemple a la **Figura 1**.

# Cens de falciot pàl·lid nidificant a Barcelona





Figura 1: exemple d'un cens de falciot pàl·lid a un quadrat UTM 1x1

## Cens de falciot pàl·lid nidificant a Barcelona

### Com identificar el falciot pàl·lid?

Considerant que en aquestes dates el falciot negre és pràcticament absent a Catalunya i només en queden alguns exemplars migradors, i que el ballester és fàcilment distingible del falciot pàl·lid, amb una mica de pràctica el cens és accessible a qualsevol persona. Tot i així, us donem algunes pistes que us permetran identificar correctament l'espècie (**Figura 2**).



**Figura 2:** Identificació del falciot pàl·lid. Basat en "Identificació dels falciots negre i pàl·lid" a Ornitho.cat (Marcel Gil i Marc Illa).

# Cens de falciot pà·lid nidificant a Barcelona

## Com puc participar en el cens?

Per a participar només t'has de posar en contacte amb nosaltres i indicar-nos quants censos t'agradaria fer i quina zona de la ciutat prefereixes. Des de la coordinació de l'Atles us assignarem els quadrats tenint en compte les vostres peticions i us enviarem els mapes dels quadrats UTM 1x1 corresponents.

### Coordinació:

David García i Marc Anton

[atles.bcn@ornitologia.org](mailto:atles.bcn@ornitologia.org)

93 256 59 91

En aquest projecte col·laboren:



**Ajuntament  
de Barcelona**



**Universitat  
de Barcelona**